Übersicht

Vorlesungswoche 4

Ulrich Görtz

Lineare Algebra 2, SS 21

Essen Seminar for Algebraic
Geometry and Arithmetic

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Erinnerung

Sei K ein Körper.

$K[X]$ ist ein Hauptidealring,

$$(a) = \{ x a ; x \in K[X] \}$$

insbesondere ein faktorieller Ring

Für $f \in K[X]$, $\alpha \in K$ gilt

$$f(\alpha) = 0 \iff (X - \alpha) \mid f.$$

Der Ring $K[X]$ ist ein Unterring des Körpers $\text{Quot}(K[X])$.

Determinanten über Ringen

$$R \text{ Ring, } M_n(R) \quad \left[M_{m \times n}(R) \right]$$

ψ

A

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

$$\left| (a_{ij})_{i,j} = A \right|$$

• Produktgesetz $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ ✓

• Invertierbarkeit $A \in M_n(R) \Leftrightarrow \det(A) \in R^{\times}$

Das charakteristische Polynom

K K -p., $n \in \mathbb{N}$

$$A \in M_n(K) \rightsquigarrow X \cdot E_n - A \in M_n(K[X])$$

$$\rightsquigarrow \det(X \cdot E_n - A) \in K[X] \quad \text{char. Pol.}$$

Trigonalisierbare Endomorphismen

K K_p , V endlichdim K -VR

$f: V \rightarrow V$ trigonalisierbar $\Leftrightarrow \exists B$ Basis von V :

$M_B^B(f)$ obere Dreiecksmatrix

Die Spur einer Matrix

$$A \in M_n(K)$$

$$\text{charpol}_A = X^n + \underbrace{a_{n-1}}_{\substack{\parallel \\ -\text{Spur}(A)}} X^{n-1} + \dots + a_1 X + \underbrace{a_0}_{\substack{\parallel \\ (-1)^n \det(A)}}$$

Das Minimalpolynom

$K, \quad n \in \mathbb{N}$

$A \in M_n(K)$ (es gibt $p \in K[X] \setminus \{0\}$
so dass $p(A) = 0$)

$\text{minpol}_A :=$ das eindeut. best. normierte Polynom p
von kleinstem Grad mit $p(A) = 0$.

Determinanten über Ringen

Vorlesungswoche 4

Ulrich Görtz

Lineare Algebra 2, SS 21

Essen Seminar for Algebraic
Geometry and Arithmetic

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Matrizen über Ringen

Sei R ein kommutativer Ring.

für $m, n \in \mathbb{N}$ sei

$$M_{m \times n}(R) = \left\{ (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} ; a_{ij} \in R \right\}$$

Wie über Körper: Addition, Multiplikation, Assoziativität, Distributivgesetz

Insbes.: $M_n(R) = M_{n \times n}(R)$ Ring

Quiz

Überlegen Sie:

- Was sind die Ziele bei der Entwicklung einer Theorie von Matrizen über kommutativen Ringen,
- ...speziell in Hinsicht auf den Begriff der Determinante.
- Wo liegen die Probleme?
- Haben Sie eine Idee, wie man die Theorie, die wir über Körpern schon haben, ausnutzen kann? Wenigstens für manche Ringe?

Quiz

Achtung: über Ringe gilt nicht
 A invert $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ $\left| \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right.$

Überlegen Sie:

- Was sind die Ziele bei der Entwicklung einer Theorie von Matrizen über kommutativen Ringen,
- ...speziell in Hinsicht auf den Begriff der Determinante.
- Wo liegen die Probleme?
- Haben Sie eine Idee, wie man die Theorie, die wir über Körpern schon haben, ausnutzen kann? Wenigstens für manche Ringe?

- Definition der Determinante
- Produktsatz
- Charakterisierung invertierbarer Matrizen

für Integritätsringe R :

$$R \subseteq K := \text{Quot}(R), \quad M_n(R) \subseteq M_n(K).$$

- können nicht durch bel. Elemente $\neq 0$ teilen
- $\rightarrow$ Gauß-Algorithmus nicht in derselben Form verfügbar

Die Determinante

Sei R kommutativer Ring, $n \in \mathbb{N}$

Für $A \in M_n(R)$ definieren wir

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

Determinante von A

Erhält $\det: M_n(R) \rightarrow R$.

Determinante und Ringhomomorphismen

$$\begin{array}{l} R \hookrightarrow \text{Quot}(R) \\ a \mapsto \frac{a}{1} \end{array}$$

Sei $f: R \rightarrow S$ ein Ringhomomorphismus.

Für $A \in M_n(R)$ sei $f(A) \in M_n(S)$ die Matrix, die aus A entsteht, indem in jedem Eintrag die Abb. f angewandt wird.

$$\text{Dann gilt } \det(f(A)) = f(\underbrace{\det(A)}).$$

Der Produktsatz

Satz Sei R ein kommut. Ring, $n \in \mathbb{N}$, $A, B \in M_n(R)$.

Dann gilt $\det(A) \cdot \det(B) = \det(AB)$.

Beweis im Fall R Integritätsring.

Dann genügt es, die Gleichheit dieser Elemente von R im Quotientenkörper $\text{Quot}(R)$ zu überprüfen.

Dort haben wir den Produktsatz in der LA 1 bewiesen.

Invertierbare Matrizen

$\mathbb{R}$ Integritätsring

$A \in M_n(\mathbb{R})$ heißt invertierbar, falls $B \in M_n(\mathbb{R})$ ex. mit

$$(\Leftrightarrow A \in M_n(\mathbb{R})^\times)$$

$$AB = E_n = BA.$$

- A invertierbar $\leadsto B$ wie oben eindeutig bestimmt,
schreibe A^{-1}

- A invertierbar $\Rightarrow \det(A) \in \mathbb{R}^\times$ (denn $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$
 $\Rightarrow \det(A)^{-1} = \det(A^{-1})$)

Satz $A \in M_n(\mathbb{R})$ invertierbar $\Leftrightarrow \det(A) \in \mathbb{R}^\times$.

Beweis ' $\Leftarrow$ ': Cramersche Regel über $\text{Quot}(\mathbb{R})$: $A \underbrace{A^{\text{ad}}}_{\in M_n(\mathbb{R})} = A^{\text{ad}} A = \det(A) \cdot E_n$

Invertierbare Matrizen

$$\leadsto B := \det(A)^{-1} \cdot A^{\text{adj}} \in M_n(\mathbb{R})$$

$\det(A) \in \mathbb{R}^\times$

Dann gilt $AB = BA = E_n$

in $M_n(\text{Quot}(\mathbb{R}))$, also auch in $M_n(\mathbb{R})$,
denn $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.

Das charakteristische Polynom

Vorlesungswoche 4

Ulrich Görtz

Lineare Algebra 2, SS 21

Essen Seminar for Algebraic
Geometry and Arithmetic

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Das charakteristische Polynom einer Matrix

$$XE_n = \begin{pmatrix} x & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & x \end{pmatrix}$$

Seien K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$, $A \in M_n(K)$.

Dann heißt

$$\det \left(\underbrace{X \cdot E_n - A}_{\in M_n(K[X])} \right) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (\delta_{i, \sigma(i)} X - a_{i, \sigma(i)}) \in K[X]$$

(Bezeichnung: $\operatorname{charpol}_A$) des charakteristischen Polynom der Matrix A .

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Bem. Ein Element $\lambda \in K$ ist genau dann ein Eigenwert von A , wenn λ eine Nullstelle von $\operatorname{charpol}_A$ ist.

Zueinander konjugierte Matrizen

K Körper, $n \in \mathbb{N}$

Lemma Seien $A \in M_n(K)$ und $S \in GL_n(K)$

Dann gilt $\text{charpol}_A = \text{charpol}_{SAS^{-1}}$

"zueinander konjugierte Matrizen haben denselbe char. Pol."

Beweis

$$\begin{aligned}\text{charpol}_{SAS^{-1}} &= \det(X \cdot E_n - SAS^{-1}) \\ &= \det(S \cdot (XE_n - A) \cdot S^{-1}) \\ &= \det(S) \cdot \det(XE_n - A) \cdot \det(S)^{-1} \\ &= \det(XE_n - A) = \text{charpol}_A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S \cdot XE_n \cdot S^{-1} &= XE_n \\ &\in M_n(K[X]) \\ &\in M_n(K(X)) \\ K(X) &:= \text{Quot}(K[X])\end{aligned}$$

Das charakteristische Polynom eines Endomorphismus

K Körper, V endlich dim.-l K -VR, $f: V \rightarrow V$

Sei B eine Basis von V .

Dann ist $\text{charpol}_{M_B^B}(f)$ unabhängig von der Wahl von B

und dieses Polynom heißt das charakteristische Polynom des Endom. f ,

und wird mit charpol_f .

Quiz

Sei K ein Körper. Berechnen Sie das charakteristische Polynom der folgenden Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Q}),$$

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K).$$

$$a, b, c, d \in K$$

Quiz

Sei K ein Körper. Berechnen Sie das charakteristische Polynom der folgenden Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Q}),$$

$$\begin{aligned} \text{charpol}_A &= \det \begin{pmatrix} X-1 & 0 & -1 \\ 0 & X-1 & 0 \\ -1 & 0 & X-1 \end{pmatrix} = (X-1)^3 - (X-1) \\ &= (X-1)(X^2-2X) \\ &\stackrel{\substack{\text{Entwicklung} \\ \text{nach 1. Spalte}}}{=} X(X-1)(X-2) \\ &= X^3 - X^2 - 2X \end{aligned}$$

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K).$$

$$\begin{aligned} \text{charpol}_B &= \det \begin{pmatrix} X-a & -b \\ -c & X-d \end{pmatrix} = X^2 - \underbrace{(a+d)}_{\text{Spur}(B)} X + \underbrace{ad-bc}_{=\det(B)} \end{aligned}$$

Quiz

Sei K ein Körper. Berechnen Sie das charakteristische Polynom einer oberen Dreiecksmatrix

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & * & \cdots & * \\ & c_{22} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ 0 & & & c_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(K).$$

Quiz

Sei K ein Körper. Berechnen Sie das charakteristische Polynom einer oberen Dreiecksmatrix

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & * & \cdots & * \\ & c_{22} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & c_{nn} \end{pmatrix} \in M_n(K).$$

$XE_n - C$ auch ober Dreiecksmatrix

$$\text{char pol}_C = (X - c_{11})(X - c_{22}) \cdots (X - c_{nn}).$$

Allgemeine Form des charakteristischen Polynoms

Bem K Körper, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $A \in M_n(K)$ $\det(XE_n - A)$

$$\leadsto \text{char pol}_A = X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$$

$\uparrow$
normiert
vom Grad n

$$\text{und } a_0 = (-1)^n \cdot \det(A).$$

$$\left[\text{denn } a_0 = \text{char pol}_A(0) \right.$$

$$= \det(0 \cdot E_n - A)$$

$$= \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

Trigonalisierbarkeit

Vorlesungswoche 4

Ulrich Görtz

Lineare Algebra 2, SS 21

Essen Seminar for Algebraic
Geometry and Arithmetic

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Algebraische und geometrische Vielfachheit von Eigenwerten

K Körper, V endl.-diml K -VR, $f: V \rightarrow V$, $\chi = \text{Charpol}_f$

Satz Sei $\lambda \in K$. Dann gilt λ EW von $f \iff \det(\lambda \cdot \text{id}_V - f) = 0$
 $\iff \chi(\lambda) = 0 \iff \text{mult}_\lambda(\chi) > 0$.

und in diesem Fall gilt

$$\underbrace{\dim V_\lambda(f)}_{\text{"geometrische Vielfachheit"}} \leq \underbrace{\text{mult}_\lambda(\chi)}_{\text{"algebraische Vielfachheit"}}$$

des EW λ von f .

Beweis Sei $v_1, \dots, v_r$ eine Basis von $V_\lambda(f)$. Wir ergänzen diese zu einer Basis $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$ von V ($n = \dim V$).

Dann gilt

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda & & & & & \\ 0 & \lambda & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & \\ \hline & & & \lambda & & \\ \vdots & & & & & \\ 0 & & & & & \end{array} \begin{array}{c} B \\ \\ \\ \\ \\ D \end{array} \right),$$

also

$$\chi = \det(X E_n - M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)) = \det \left(\begin{array}{ccc|ccc} X E_r - \lambda E_r & & & & & \\ \hline & & & & & -B \\ 0 & & & & & \hline & & & & & X E_{n-r} - D \end{array} \right)$$

$$= (X - \lambda)^r \cdot \det(X E_{n-r} - D)$$

$$\Rightarrow (X - \lambda)^r \mid \chi \quad \Rightarrow \quad \text{mult}_{\lambda}(\chi) \geq r = \dim V_{\lambda}(f).$$

Quiz

Bestimmen Sie algebraische und geometrische Vielfachheit aller EW der Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 2 & \\ & & 0 & 3 \\ & & & -1 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{C})$$

(alle Einträge, die nicht hingeschrieben sind, sind $= 0$).

Quiz

Bestimmen Sie algebraische und geometrische Vielfachheit aller EW der Matrix

EW λ	$\text{mult}_\lambda(\text{charpol})$	$\dim V_\lambda$
0	3	1
-1	1	1

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 2 & \\ & & 0 & 3 \\ & & & -1 \end{pmatrix} \stackrel{=A}{\in} M_4(\mathbb{C})$

(alle Einträge, die nicht hingeschrieben sind, sind $= 0$).

Diagonalisierbarkeit und charakteristisches Polynom

K Körper, V endlichdim. VR, $f: V \rightarrow V$

Satz Dann sind äquivalent: (i) f diagonalisierbar

(ii) charpol_f zerfällt vollst. in Linearfaktoren
und für alle EW λ von f gilt

$$\dim V_\lambda(f) = \text{mult}_\lambda(\text{charpol}_f)$$

Beweis (i) $\Rightarrow$ (ii). Einfach

(ii) $\Rightarrow$ (i). Seien $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ die verschiedenen EW von f .

Dann gilt: f diag'bar $\Leftrightarrow V = \bigoplus_{i=1}^r V_{\lambda_i}(f) \Leftrightarrow \dim V = \sum_i \dim V_{\lambda_i}(f)$.

Wird charpol_f vollst. in LF zerfällt und seine Nullstellen genau die Elem. $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$ sind, gilt

$$\deg \text{charpol}_f = \sum_{i=1}^r \text{mult}_{\lambda_i}(\text{charpol}_f).$$

Also $\dim V = \deg \text{charpol}_f = \sum_i \text{mult}_{\lambda_i}(\text{charpol}_f) = \sum_{i=1}^r \dim V_{\lambda_i}(f)$

Trigonalisierbare Endomorphismen

K Körper

V endlichdim'l K -VR

$n \in \mathbb{N}$

Def. (1) Ein Endom. $f: V \rightarrow V$ heißt trigonalisierbar, wenn eine Basis $\mathcal{B}$ von V existiert, s.d. $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ eine obere Dreiecksmatrix ist.

(2) Eine Matrix $A \in M_n(K)$ heißt trigonalisierbar, wenn A zu einer oberen Dreiecksmatrix konjugiert ist, d.h., wenn $S \in GL_n(K)$ ex., so dass SAS^{-1} eine obere Dreiecksmatrix ist.

Quiz

Seien K ein Körper, $n \geq 1$ und A eine trigonalisierbare Matrix in $M_n(K)$.
Zeigen Sie, dass A einen Eigenvektor besitzt.

Sei K ein Körper und sei $A \in M_2(K)$.

Beweisen Sie: A ist genau dann trigonalisierbar, wenn A einen Eigenvektor hat.

Zeigen Sie an einem Beispiel, dass dieselbe Aussage für (3×3) -Matrizen nicht wahr ist.

Quiz

Seien K ein Körper, $n \geq 1$ und A eine trigonalisierbare Matrix in $M_n(K)$.

Zeigen Sie, dass A einen Eigenvektor besitzt.

Charpol_A zerfällt vollst. in Linearfaktoren,
hat also mindestens eine Nullstelle in K

Sei K ein Körper und sei $A \in M_2(K)$.

$\exists$ Standardbasis von K^2

Beweisen Sie: A ist genau dann trigonalisierbar, wenn A einen Eigenvektor hat.

noch zu zeigen: A hat EV b_1
 $\Rightarrow A$ trigonalisierbar

Begr. Ergänze b_1 zu Basis $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$.

Für $S = M_{\mathcal{B}}^E$ gilt $S A S^{-1} = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$.

Zeigen Sie an einem Beispiel, dass dieselbe Aussage für (3×3) -Matrizen nicht wahr ist.

Seien $K = \mathbb{Q}$ und $A = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & 1 \\ & -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Q})$.

Dann ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ein EV von A , aber

Charpol_A = $X(X^2+1)$ zerfällt über $\mathbb{Q}$ nicht vollst.
in LF.

charpol_f für $V = U \oplus W, f(U) \subseteq U$

Lemma K K_p -, V endlichdim K -VR, $f: V \rightarrow V$ Endom.

Seien $U, W \subseteq V$ UVR mit $V = U \oplus W$ und $f(U) \subseteq U$.

Sei $g: U \rightarrow U, u \mapsto f(u)$ die Einschränkung von f auf U

$h: W \rightarrow W, \begin{matrix} \in W \\ v \end{matrix} \mapsto \pi(f(v))$ ($f|_U$)

wobei $\pi: V = U \oplus W \rightarrow W$
 $u + w \mapsto w$ · $u \in U, w \in W$
Projektion auf W

Dann gilt

$$\text{charpol}_f = \text{charpol}_g \cdot \text{charpol}_h.$$

Trigonalisierbarkeit und charakteristisches Polynom

Satz $K = K_f$, V endlichdim K -VR, $f: V \rightarrow V$. Dann sind äquivalent:

(i) f ist trigonalisierbar

(ii) Charpol_f zerfällt vollst. in Linearfaktoren.

Beweis (i) $\Rightarrow$ (ii) Einfach.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Sei $\dim V > 0$. Weil Charpol_f vollst. in LF zerfällt und $\text{Grad} = \dim V > 0$ hat, hat Charpol_f eine Nullstelle $\lambda \in K$, dies ist ein EW von f . Sei $v \in V_\lambda(f) \setminus \{0\}$.

Wir ergänzen $v =: b_1$ zu einer Basis $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ von V .

Es sei $U = \langle b_1 \rangle$, $W = \langle b_2, \dots, b_n \rangle \subset V$, also $U \oplus W = V$.

$\implies$ $\text{charpol}_f = (X - \lambda) \cdot \text{charpol}_h$, $h: W \rightarrow W$
 wie im Lemma.
 Lemma

Wird charpol_f vollst. in $\mathbb{C}[X]$ zerfällt, gilt dies auch für charpol_h .

Per Induktion: $h \in \text{End}_{\mathbb{C}}(W)$ trigonalisierbar.

Es ex. also eine Basis $\mathcal{C} = (c_2, \dots, c_n)$ von W ,

so dass $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(h)$ obere Dreiecksmatrix ist

Sei $\mathcal{B}' = (b_1, c_2, \dots, c_n)$. Dann ist $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & * & \dots & * \\ 0 & \boxed{M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(h)} & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$

eine obere Dreiecksmatrix.

Spur und charakteristisches Polynom

Vorlesungswoche 4

Ulrich Görtz

Lineare Algebra 2, SS 21

Essen Seminar for Algebraic
Geometry and Arithmetic

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Die Spur einer Matrix

K Körper, $n \in \mathbb{N}$

Für $A = (a_{ij})_{i,j} \in M_n(K)$ heißt

$$\text{Spur}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii} \quad \text{die \u201cSpur\u201c der Matrix } A.$$

$\leadsto$ $\text{Spur}: M_n(K) \rightarrow K$,

linear: $\text{Spur}(A+B) = \text{Spur}(A) + \text{Spur}(B)$

(Es gilt $\text{Spur}(AB) = \text{Spur}(BA)$)

$$\text{Spur}(aA) = a \text{Spur}(A) \quad (a \in K)$$

$\leadsto$ zueinander konjugierte Matrizen haben dieselbe Spur:

$$\text{Spur}(SAS^{-1}) = \text{Spur}(AS^{-1}S) = \text{Spur}(A)$$

Spur und charakteristisches Polynom

$K = K_p, n \in \mathbb{N}.$

Satz. Sei $A \in M_n(K)$ mit $\text{charpol}_A = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0.$

Dann gilt, $a_{n-1} = -\text{Spur}(A).$

Beweis Drücke $\text{charpol}_A = \det(X E_n - A)$ mit der Leibniz-Formel.

Es kann einen Beitrag zum Koeff. von X^{n-1} nur für solche $\sigma \in S_n$ geben, für die $\sigma(i) = i$ für alle bis auf höchstens ein $i \in \{1, \dots, n\}$ gilt.

Das gilt nur für $\sigma = \text{id}$. Dafür ist der Beitrag

in der Leibniz-Formel gleich $(X - a_{11}) \cdot \dots \cdot (X - a_{nn}).$

wo $A = (a_{ij})_{i,j}$

Die Spur eines Endomorphismus

Es folgt: zueinander konjugierte Matrizen haben dieselbe Spur.

Also: Ist V ein endl.-dim'l K -VR und $f: V \rightarrow V$ ein Endom.,
dann ist $\text{Spur}(M_B^{OB}(f))$ unabhängig von der Wahl der Basis B .

Deshalb können wir in dieser Situation definieren: $\text{Spur}(f) := \text{Spur}(M_B^{OB}(f))$

$\in K$

"Spur des Endom. f "

Quiz

Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Sei V der K -Vektorraum der Polynome vom Grad $< n$, also

$$V = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i; a_i \in K \right\} \subseteq K[X]$$

Für $f = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \in V$ sei

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n-1} i a_i X^{i-1}.$$

Berechnen Sie die Spur des Endomorphismus $D: V \rightarrow V$ von V .

Quiz

Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Sei V der K -Vektorraum der Polynome vom Grad $< n$, also

$$V = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i; a_i \in K \right\} \subseteq K[X]$$

Für $f = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \in V$ sei

$$D(f) = \sum_{i=1}^{n-1} i a_i X^{i-1}.$$

Basis

$$\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1})$$

Berechnen Sie die Spur des Endomorphismus $D: V \rightarrow V$ von V .

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 2 & & \\ & & 0 & \ddots & \\ & & & \ddots & n-1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \text{ hat Spur } 0. \quad \text{charpol}_D = X^n$$

nächste
Woche

$$D^n = 0.$$

Ergänzung

Ist K ein Körper der Charakteristik 0
(d.h. dass der Ringhomomorphismus $\mathbb{Z} \rightarrow K$ injektiv ist),
dann kann man zeigen:

z.B. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

Sind $A, B \in M_n(K)$ Matrizen mit $\text{Spur}(A^i) = \text{Spur}(B^i)$ für alle $i \geq 0$, dann gilt

$$\text{charpol}_A = \text{charpol}_B.$$

Das Minimalpolynom

Vorlesungswoche 4

Ulrich Görtz

Lineare Algebra 2, SS 21

Essen Seminar for Algebraic
Geometry and Arithmetic

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Vorüberlegung zum Minimalpolynom

K Körper, $m \in \mathbb{N}$

Ist $A \in M_n(K)$, dann existiert $p \in K[X] \setminus \{0\}$ mit $p(A) = 0$.

Dann der Einsetzungshomom. $\phi: K[X] \rightarrow M_n(K)$
 $X \mapsto A$

ist auch K -VR-Homom., und $K[X]$ ist als K -VR unendlichdim.

Weil $M_n(K)$ endliche Dimension hat, kann ϕ nicht injektiv sein,

es existiert also $p \in \ker(\phi) \setminus \{0\}$

Definition: Minimalpolynom einer Matrix

K $n \in \mathbb{N}$.

Sei $A \in M_n(K)$. Sei $\Phi: K[X] \rightarrow M_n(K)$, $X \mapsto A$, Einsetzungshomomorphismus

Dann ist $\text{Ker}(\Phi) \subseteq K[X]$ ein von 0 verschiedenes Ideal.

Weil $K[X]$ ein Hauptidealring ist, ex. $p \in K[X] \setminus \{0\}$ mit $\text{Ker}(\Phi) = (p)$.

Wir können annehmen, dass p normiert ist; deshalb ist p dann endl. bestimmt.

Def. Das endl. best. normierte Polynom, das das Ideal $\text{Ker}(\Phi)$ erzeugt, heißt das Minimalpolynom der Matrix A . Berechnung $\text{minpol}_A \in K[X]$

Äquivalenz. minpol_A ist das endl. best. normierte Polynom $\neq 0$ kleinsten Grades, das bei Einsetzen von A die Nullmatrix liefert.

Definition: Minimalpolynom einer Matrix

Ist $q \in K[X]$ irgendein Polynom mit $q(A) = 0$, dann $[q \in \text{Ker}(\phi) = (\text{minpol}_A)]$
gilt $\text{minpol}_A \mid q$.

Quiz

Sei K ein Körper. Berechnen Sie die Minimalpolynome der folgenden Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(K).$$

$$D = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) \in M_n(K)$$

Quiz

Sei K ein Körper. Berechnen Sie die Minimalpolynome der folgenden Matrizen:

Für $p \in K[X]$ ist
 $p(D) = \text{diag}(p(a_1), \dots, p(a_n))$.

Seien $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ die
paarweise verschiedenen
Einträge von D auf der
Diagonale ($r \leq n$).

Dann gilt $\text{minpol}_D = (X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_r)$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(K).$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = 0$$

$$\leadsto \text{minpol}_A = X^3$$

$$\rightarrow D = \text{diag}(a_1, \dots, a_n) \in M_n(K)$$

Quiz

Sei K ein Körper. Geben Sie $n \in \mathbb{N}$ und eine Matrix $A \in M_n(K)$ mit Minimalpolynom $(X - 1)^3$ an.

Quiz

Sei K ein Körper. Geben Sie $n \in \mathbb{N}$ und eine Matrix $A \in M_n(K)$ mit Minimalpolynom $(X-1)^3$ an.

$$\text{Sei } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{also } A - E_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dann gilt $(A - E_n)^3 = 0$, $(A - E_n)^2 \neq 0$, also $\text{minpol}_A = (X-1)^3$.

Definition: Minimalpolynom eines Endomorphismus $K \subset K_p$.

V endlichdiml K -VR, $f \in \text{End}_K(V)$

Dann ist $\Phi: K[X] \rightarrow \text{End}_K(V)$ nicht injektiv,

$$\begin{array}{l} X \mapsto f \\ \left[\begin{array}{l} a \\ a \\ K \end{array} \right] \mapsto a \cdot \text{id}_V \end{array}$$

und das end. bestimmte normierte Polynom $p \in K[X]$ mit $\text{Ker}(\Phi) = (p)$ heißt das Minimalpolynom von f , geschrieben $\text{minpol}_f \in K[X]$.

Minimalpolynom und konjugierte Matrizen

$K \neq \mathbb{F}_p, n \in \mathbb{N}$

Lemma Seien $A \in M_n(K)$ und $S \in GL_n(K)$.

Dann haben A und SAS^{-1} dasselbe Minimalpolynom.

Beweis Für $p \in K[X]$ gilt $p(SAS^{-1}) = S \cdot p(A) \cdot S^{-1}$,

insbesondere gilt $p(SAS^{-1}) = 0 \iff p(A) = 0$

Alternativ:

"kommutatives Diagramm"

(d.h. $\phi_{SAS^{-1}} = c \circ \phi_A$)

c Ringisomorphismus

$\implies \ker(\phi_A) = \ker(\phi_{SAS^{-1}})$

Lemma V endl.-dim'l K -VR mit Basis $\mathcal{B}$, $f: V \rightarrow V$ Endom...

Dann gilt $\text{minpol}_f = \text{minpol}_{M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)}$.

Beweis